

REVERSIÓN DE LA PÍLDORA DE ABORTO ¿TENER SEGUNDOS PENSAMIENTOS?

**PUEDE NO SER
DEMASIADO TARDE**

Si ha tomado la pildora abortiva y ha cambiado de opinion, llame a la linea directa de reversión de la pildora abortiva de inmediato.

877-558-0333

Linea de pacientes 24/7

abortionpillreversal.com

info@apr.life

“No seguir adelante con la pildora abortiva ha sido una gran bendicion. Mi nina es la alegria de mi vida y realmente no se que haria sin ella. Estoy muy agradecido de que Dios haya puesto a las personas en mi camino que pudieron asegurarse de que mi angelito tuviera una oportunidad en la vida.”



hecho por humanlifealliance | humanlife.org

¿REALMENTE NO ES TARDE?

Si los trabajadores del centro de aborto te dijeron que debes tomar la segunda píldora, esto no es cierto. No es médicamente necesario tomar la segunda píldora. **No tome la segunda píldora si desea revertir el aborto.** Lo que decida, la atención médica es su próximo paso vital. Póngase en contacto con la línea directa de reversión de la píldora abortiva las 24 horas, los 7 días de la semana. La línea directa la remitirá a un Centro de ayuda para el embarazo. Para revertir el aborto, el Centro de ayuda para el embarazo administra el medicamento de reversión sin cargo. No se puede garantizar la reversión del aborto, pero las posibilidades de éxito son mayores cuanto antes tome el medicamento de reversión. Los estudios muestran una tasa de éxito del 64-68% si el medicamento se toma dentro de las primeras 72 horas.*

El Centro de ayuda para el embarazo probablemente también le hará un ultrasonido y podrá ver a su bebé.



Para asistencia con las necesidades materiales para su bebé:

Envíe "HELPLINE" al 313131 o llame al 1-877-558-0333


¿CÓMO FUNCIONA?



1. La progesterona es la hormona que protege el revestimiento del útero. La primera píldora, RU-486, bloquea su progesterona y hace que su revestimiento uterino se rompa.



2. RU-486 corta la sangre y la nutrición de su bebé. El objetivo es matar de hambre a su hijo por nacer.



3. 24-48 horas después, se toma la segunda píldora, Misoprostol, que causa contracciones que pueden causar calambres dolorosos y sangrado abundante para provocar un aborto.



4. Se le indicará que aborte en su casa sobre su inodoro. Si (miraras) de cerca, verías a tu hijo muerto. Incluso a las siete semanas, es probable que vea sus dedos de manos y pies.

Si está cambiando de opinión, comuníquese con 1-877-558-0333 o visite abortionpillreversal.com

* Davenport, Mary y col. "La supervivencia del embrión después de la mifepristona: una revisión sistemática de la literatura". Temas de derecho y medicina 2017, 32 (1): 3-18.